

INSTRUÇÕES DE COLETA: **INFLUENZA H1N1**

MATERIAL E VOLUME:

- Escarro: 3,0 mL
- Lavado brônquico alveolar: 3,0 mL
- Aspirado traqueal: 1,0 mL
- Aspirado ou lavado de nasofaringe: 1,0 mL
- Aspirado ou lavado de orofaringe: 1,0 ML

DEMAIS MATERIAIS:

- escarro, lavado brônquico alveolar, aspirado traqueal, aspirado/lavado de nasofaringe ou orofaringe deverão ser enviados em frasco estéril.

TEMPERATURA:

Até 48 horas refrigerado entre 2 e 8 °C, em frasco estéril:

- Escarro.
- Lavado brônquico alveolar.
- Aspirado traqueal.
- Aspirado ou lavado de nasofaringe.
- Aspirado ou lavado de orofaringe.

Até 48 horas refrigerado entre 2 e 8 °C, em kit próprio. Após este período congelar:

- Swab combinado de nasofaringe e orofaringe.
- Swab de nasofaringe.
- Swab de orofaringe.

INSTRUÇÕES

- Para coleta de swab de orofaringe e/ou swab de nasofaringe, solicitar kit próprio fornecido pelo Laboratório Maricondi.
- Realizar a coleta entre o 1º e 7º dia após aparecimento dos sintomas: febre, tosse, dor de garganta, coriza e dispnéia.
- Lavado brônquico alveolar, aspirado traqueal, aspirado e/ou lavado de nasofaringe e aspirado e/ou lavado de orofaringe deve ser coletada por um profissional capacitado.

COLETA:

Utilização de kit próprio para coleta de swab de nasofaringe e/ou orofaringe:

- Usar swab com ponta sintética (Rayon ou Dacron) e haste plástica ou de alumínio. Enviar amostra em frasco com meio de transporte: com solução salina tamponada PBS pH7.2) ou frasco estéril com solução conservante de RNA.
- **Material para a coleta:** 2 swabs, 1 meio de transporte e 1 abaixador de língua.

PROCEDIMENTO DA COLETA:

- Lavar as mãos.
- Paramentação de EPI's na ordem a seguir: Jaleco descartável (por cima do jaleco), máscara descartável, gorro, luvas plásticas e luvas de procedimento por cima da plástica.
- Orientar o cliente sobre a coleta que será realizada, poderá haver incômodo - ardência ou lacrimejamento.
- Identificar o material (meio de transporte).

1ª - COLETA DE OROFARINGE:

- Posicionar a cabeça do cliente para trás. Retirar a máscara de procedimento do cliente.
- Posicionar o abaixador de língua.
- Introduzir um swab no fundo da garganta, sem tocar amídalas e úvula.
- Descarregar o material presente no swab no meio de transporte: Girar o swab e agitá-lo suavemente no meio.
- Após descartar este swab.

2ª - COLETA DE NASOFARINGE:

- Posicionar a cabeça do cliente para trás. O cliente deverá utilizar a máscara de procedimento tampando a boca.
- Introduzir novo swab na narina direita suavemente e profundamente, e com movimentos giratórios.
- Descarregar o material presente no swab no meio de transporte, conforme descrito na coleta de orofaringe.
- Introduzir outro swab na narina esquerda e seguir procedimentos descritos para narina direita.

PROCEDIMENTO APÓS COLETA:

- Verificar o estado do paciente e liberá-lo.
- Desparamentação de EPI's e descarte na ordem a seguir: luvas de látex, óculos, máscara descartável, jaleco descartável, e luvas plásticas.
- Higienizar as mãos: água, sabão e álcool 70.
- Lembrete: Higienizar os óculos de proteção, utilizando água e sabão em seguida álcool 70.

CRITÉRIOS DE REJEIÇÃO:

- Amostras coletadas e enviadas em frasco não estéril.
- Swabs com ponta de algodão.
- Swabs com haste de madeira.
- Swabs produzidos com Alginato de cálcio.
- Escarro com grande quantidade de saliva.

QUESTIONÁRIO:

Informar as questões abaixo:

- Data do início dos sintomas gripais (febre, tosse, dor de garganta, coriza, dor de cabeça, etc.).
- Paciente está com febre?
- Paciente está em uso de antivirais (Ex: Oseltamivir)?
- Paciente está internado?